


Buprénorphine + Naloxone



PHARMACOLOGIE

La **buprénorphine** est un **agoniste-antagoniste morphinique** et se fixe au niveau des récepteurs cérébraux μ et κ . Son activité dans le traitement de substitution des opioïdes est attribuée à sa liaison lentement réversible aux récepteurs μ qui minimiserait de façon prolongée le besoin des toxicomanes en stupéfiants.

La **naloxone** est un **antagoniste pur** et spécifique des morphinomimétiques sans effet agoniste. Lorsqu'elle est injectée à des sujets ayant reçu des morphinomimétiques, la naloxone antagonise leurs effets (dépression respiratoire, myosis, analgésie). Administrée seule, elle est dépourvue de propriétés pharmacologiques propres.

La naloxone permet d'éviter un mésusage du traitement par voie intraveineuse.

PRODUITS SUR LE MARCHÉ

Suboxone® 2 mg/0,5 mg cp subling
Suboxone® 8 mg/2 mg cp subling
Buprenorphine/Naloxone 2 mg/0,5 mg cp
Buprenorphine/Naloxone 4 mg/1 mg cp
Buprenorphine/Naloxone 8 mg/2 mg cp

NOTES

Substance dopante, Hors de la vue et de la portée des enfants, Les médicaments non utilisés sont à rapporter à la pharmacie

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



CARACTERISTIQUES

Indication

Traitement substitutif de la pharmacodépendance aux opiacés dans le cadre d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique.

Liste

Liste I assimilé stupéfiant

Formes

Comprimés sublinguaux

Posologies

Dose initiale recommandée de 2 à 4 mg de buprénorphine
Augmentation par paliers de 2 à 8 mg jusqu'à 24 mg/j
Peu de variations interindividuelles

Contre-indications

Hypersensibilité à la buprénorphine, enfants de moins de 15 ans, insuffisance respiratoire ou hépatique sévère, intoxication alcoolique aiguë, association à de la méthadone ou à des analgésiques morphiniques

Interactions médicamenteuses

(idem buprénorphine haut dosage)
Médicaments dépresseurs du système nerveux central (neuroleptiques, antihistaminiques, anxiolytiques, barbituriques...)
Inducteurs enzymatiques (rifampicine, phénytoïne, phénobarbital...)
Inhibiteurs enzymatiques (inhibiteur de la recapture de la sérotonine, cimétidine...)

Effets indésirables

(idem buprénorphine haut dosage)
Symptômes de manque (24 premières heures)
Constipation, insomnies, céphalées, nausées, sueurs et douleurs

Initiation au traitement

Prescription initiale par tous les médecins
Initiation du traitement dès les premiers signes de sevrage mais pas moins de 4h après la dernière prise d'opioïdes

Prescription

Ordonnance sécurisée
Durée maximale de 28 jours
Prise en charge par l'Assurance maladie si présence du nom du pharmacien

Délivrance

Délivrance fractionnée par période de 7 jours maximum
Renouvellement de l'ordonnance interdit
Délivrance quotidienne pratiquée avec l'accord du patient, accord préalablement fait entre le pharmacien et le médecin