



## PRE-TEST CONNAISSANCES

Objectif pédagogique : Évaluer son positionnement initial.

Ce questionnaire vous permet de contrôler vos connaissances avant toute navigation sur le site. Vous trouverez ensuite les réponses aux questions dans les différentes parties de la formation. Bonne réflexion !



	VRAI	FAUX
1. La consommation d'héroïne n'induit pas de forte dépendance, uniquement un risque de décès en cas de surdosage.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. On parle de sevrage lorsque le consommateur cherche à augmenter la fréquence et les doses d'opiacés pour retrouver les sensations ressenties lors des premières prises.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. La buprénorphine haut dosage est administrée par voie sublinguale et est un médicament de liste 1 « assimilé stupéfiant ».	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Il y a un risque de mésusage de la buprénorphine haut dosage avec une utilisation intraveineuse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Concernant la méthadone, la forme sirop est en relais de la forme gélule chez des patients stabilisés.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. La naloxone est associée à la buprénorphine afin de réduire ses effets indésirables (constipation, insomnie...).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Le sulfate de morphine ne dispose pas d'AMM en France comme traitement substitutif des pharmacodépendances majeures des opiacés.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Une coprescription de benzodiazépines avec le traitement de substitution aux opiacés est fortement recommandée.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Il n'y a pas de durée optimale pour un TSO. Une demande d'arrêt de TSO ne peut venir que du patient lui-même.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Le Stéribox® et le Programme d'échange de seringues en pharmacie (PESP) sont des outils de réduction des risques utilisables en pharmacie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. La naloxone est disponible sans ordonnance à l'officine sous forme intramusculaire.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. La naltrexone est utilisée en urgence lors d'une overdose aux opioïdes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. La prise de buprénorphine haut dosage est contre-indiquée chez la femme enceinte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. La prise de médicaments de substitution aux opiacés est contre-indiquée chez l'enfant de moins de 15 ans.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Les patients sous méthadone ou buprénorphine haut dosage ne ressentent plus la douleur car ce sont des analgésiques puissants.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prise de notes :

.....

.....

.....

.....

.....

.....